



PORTUGUÊS

ISODIOLEX 6000MG (50mg/ml CBD)

ISODIOLEX 6000

É um óleo de coco de grau farmacêutico infundindo em um concentrado do canhâmo, refinado para pureza de $\geq 99\%$ de canabidiol (CBD) natural, livre de conservantes, sabores e aditivos.

1- COMPOSIÇÃO DO PRODUTO

Cada 1ml do óleo contém 50mg de CBD puro $\geq 99\%$. Óleo de semente de canhâmo orgânico puro não refinado, ISO99TM (óleo de canhâmo anidro bioativo), triglicerídeos de cadeia média (derivado de coco orgânico)

DEVE SER USADO DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO MÉDICA.

2- ADMINISTRAÇÃO

- 1- Remova a tampa do frasco apertando-a e girando-a no sentido anti-horário.
- 2- Utilize uma das seringas orais de sua embalagem e com o frasco na posição vertical empurre a seringa firmemente no encaixe do frasco.
- 3- Com o frasco de cabeça para baixo, puxe o êmbolo lentamente para transferir o óleo do frasco para a seringa.
- 4- Caso ocorra bolhas de ar dentro da seringa, mova o êmbolo para removê-las.
- 5- Puxe o êmbolo até o ponto na escala graduada que corresponde à dose recomendada.
- 6- Ao remover a seringa, mantenha-a na posição horizontal para evitar a perda do conteúdo na hora da administração (dose).
- 7- Volte o frasco à posição vertical e tampe-o (no sentido horário).
- 8- Segure a seringa e empurre o êmbolo de forma que o conteúdo seja dispensado diretamente na boca do paciente.

NÃO empurre o êmbolo para baixo com força. Após o uso, siga as instruções de limpeza da seringa no item 6 deste informativo.

3- INFORMAÇÕES SOBRE DOSAGEM

Cada 0,1ml de óleo contém 5mg de CBD

Dose de 12,5mg CBD = 0,25ml de óleo

Dose de 25mg CBD = 0,5ml de óleo

Dose de 50mg CBD = 1ml de óleo

4- ARMAZENAMENTO

O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente (até 25°C), local seco, protegido de luz e fora do alcance de crianças.

5- INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Cinco seringas orais são fornecidas com este produto. Use uma seringa por até 30 vezes e a substitua após 7 dias por uma nova seringa.

ATENÇÃO: Consulte seu médico em suspeita de gravidez, se estiver amamentando ou tomando alguma outra medicação.

6- INSTRUÇÕES PARA A LIMPEZA DA SERINGA ORAL

- a) Ferva a água, deixe-a esfriar e puxe-a com a seringa para eliminar o resíduo depositado.
- b) Repita o processo até a eliminação total do resíduo.
- c) Separadamente, lave a seringa e o êmbolo em água morna com sabão.
- d) Enxague bem em água previamente fervida e esfriada.
- e) Seque com um papel toalha.
- f) Remonte a seringa e armazene-a em um recipiente limpo, seco e com tampa.

OBSERVAÇÃO: A seringa e o êmbolo não devem ser autoclavados a vapor e nem colocados em água fervente ou em forno de micro-ondas. A seringa deve ser descartada caso o manuseio do êmbolo se tornar difícil ou se a graduação da seringa torna-se ilegível.

Certifique-se quanto ao procedimento com seu médico ou profissional da saúde.

Dúvidas e comentários

farmaceutica@farmausa.com ou gerenciabcd@farmausa.com

www.farmausa.com

0800-777-9750

Fabricado por/Sob licença da:

ISO Internacional, LLC

2215 Auto Park Way Escondido, CA 92029